

# الأدوية التي يجب الإمتناع عنها قبل فحص الجلد للحساسية

## والمدة اللازمه

مدّة الإمساك قبل الفحص	نوع الدواء
	<b>مضادات الهستامين</b>
< 2 أيام	مثل هيدرالازين®, درمالين®, بينادرل®, برمالان®, هستوب®
< 7 أيام	مثل زرتك®, أريوس®, لورينيز®, ايباستيل®
< 5 أيام	كينتوفين: مثل زاندين®
< 1 أيام	مضادات الهستامين 2: مثل الزانتاك® - للمعدة
< 2 أيام	أدوية الكحة التي تحوي مضاد هستامين: مثل سيكيسان®, توبليكسل®
< 7 أيام	قطرات العين التي تحوي مضاد هستامين: مثل باتانول®, ريانيست®
< 5 أيام	بخاخات الأنف التي تحوي مضاد هستامين: مثل اليرجودل®, ليفوستين®
	<b>العلاج الموضعي (مكان الفحص)</b>
< 7 أيام	الكورتزون الموضعي: مثل كيوثيفيت®, اليكوم®, فيوزيكورت®, بنتوفيت®
< 7 أيام	مضاد التهاب غير كورتزوني: مثل إلبدل®, بروتوبك®
	<b>العلاج الكورتزوني الداخلي</b>
< 3 أيام	بردنيزون أقل من 50 مج باليوم – او ما يساويه
< 7 أيام	بردنيزون أكثر من 50 مج باليوم – او ما يساويه
	<b>علاجات داخلية أخرى</b>
< 4 أسابيع	زولير®
	<b>مضادات الإكتئاب</b>
< 7 أيام	دكسبين®
< 3 أيام	ديسبيرامين®